

Informationsblatt LFL Fadenlifting

Vor der Behandlung

- Setzen Sie blutverdünnende Medikamente (z.B. Aspirin, Thomapyrin) 2 Wochen vor dem geplanten Eingriff ab.

Die Injektionsbehandlung wird ambulant in der Ordination durchgeführt.

Im Anschluss an die Behandlung können Sie den gewohnten Tagesablauf wieder aufnehmen.

Während der Behandlung

Die Behandlung dauert etwa 30 Minuten und wird in lokaler Betäubung durchgeführt.

Nach gründlicher Reinigung und Anzeichnung des Fadenverlaufs werden mit Hilfe der Injektionsnadel die PDO-Faden eingeführt.

Nach Entfernung der Injektionsnadel liegt der Faden an der gewünschten Stelle.

Zum Abschluss der Behandlung erhalten Sie noch eine kühlende Gesichtsmaske.

Nach der Behandlung

Kleine Rötungen an der Einstichstelle sind wahrscheinlich, es können aber auch kleine blaue Flecken entstehen, die für einige Tage sichtbar bleiben.

Schwellungen und Spannungsgefühle können unmittelbar nach der Behandlung vorübergehend auftreten.

Am Folgetag ist die normale Gesichtspflege und das Tragen von Make-up wieder möglich.

- Vermeiden Sie zu starke Gesichtsbewegung sowie Gesichtsmassagen, sportliche Aktivität und Hitze (Sonne, Sauna) für 2 Wochen.