

Informationsblatt Ohrkorrektur

Vor der Behandlung

- Setzen Sie blutverdünnende Medikamente (z.B. Aspirin, Thomapyrin) 2 Wochen vor dem geplanten Eingriff ab.
- Verzichten Sie in den 6 Wochen rund um den Eingriff auf Zigaretten.
- Nehmen Sie ein Stirnband, das straff anliegt, zum vereinbarten Termin mit.

Die Aufnahme in die Klinik erfolgt in der Regel am Vortag der Operation, in der noch alle notwendigen, präoperativen Untersuchungen sowie die Anfertigung von Fotos zur Dokumentation durchgeführt werden.

Während der Behandlung

Der Eingriff erfolgt in Lokalanästhesie mit zusätzlichem Dämmerschlaf oder Vollnarkose. Die Operation dauert etwa 1 Stunde. Die Schnittführung erfolgt unmittelbar hinter dem Ohr. Sie erhalten einen Kopfverband.

Nach der Behandlung

Nach Dämmerschlaf oder Vollnarkose sehen sie leicht verschwommen wegen der Augensalbe, die sie während der Operation erhalten haben.

Postoperativ kann es zu Wundschmerzen und Spannungsgefühlen kommen, die sich aber mit entsprechender Medikation gut behandeln lassen.

Der Kopfverband wird am 1. postoperativen Tag entfernt und Ihr Stirnband angelegt.

Fühlen Sie sich fit genug, können Sie noch am selben Tag oder 1. Tag nach dem Eingriff aus der Klinik entlassen werden.

Schwellungen, leichte Unregelmäßigkeiten und blaue Flecken sind völlig normal und können 1-2 Wochen anhalten.

Nach 14 Tagen wird die Naht rückgekürzt, eine Nahtentfernung ist nicht nötig, da es sich um selbstauflösende Fäden handelt.

Eine spezielle Narbensalbe ist in der Regel nicht erforderlich, die Narbenpflege ist mit Wund- und Heilsalbe ausreichend.

Üblicherweise sind sie nach etwa 10 Tagen wieder gesellschaftsfähig.

Der Operationserfolg ist frühestens nach 6 Wochen beurteilbar.

- Körperliche Schonung ist für 3 Tage empfohlen.
- Ihr Stirnband ist für 1 Woche konsequent Tag und Nacht und für 2 weitere Wochen nachts zu tragen.
- Waschen Sie Ihre Haare erst fünf Tage nach dem Eingriff wieder.
- Vermeiden Sie sportliche Aktivität, Vollbäder sowie Saunabesuche für mindestens 3 Wochen.