

Informationsblatt Schnellender Finger

Vor der Behandlung

- Setzen Sie blutverdünnende Medikamente (z.B. Aspirin, Thomapyrin) 2 Wochen vor dem geplanten Eingriff ab.
- Verzichten Sie in den 6 Wochen rund um den Eingriff auf Zigaretten.

Die Aufnahme in die Klinik erfolgt in der Regel am Tag der Operation, in der noch alle notwendigen, präoperativen Untersuchungen sowie die Anfertigung von Fotos zur Dokumentation durchgeführt werden.

Während der Behandlung

Der Eingriff erfolgt in Lokalanästhesie und dauert etwa 15 Minuten. Die Schnittführung erfolgt in der Hohlhand über dem A1 Ringband des betroffenen Fingers. Sie erhalten einen Schutzverband.

Nach der Behandlung

Postoperativ kann es zu Wundschmerzen und Spannungsgefühlen kommen, die sich aber mit entsprechender Medikation gut behandeln lassen.

Die sofortige Fingerbewegung ist erwünscht.

Sie können die Klinik am selben Tag verlassen.

Die Nahtentfernung erfolgt am 14. postoperativen Tag.

Schwellungen und Spannungsgefühle können auftreten und bis zu 4 Wochen anhalten.

Eine spezielle Narbensalbe ist in der Regel nicht erforderlich, die Narbenpflege ist mit Wund- und Heilsalbe ausreichend.

Der Operationserfolg ist in der Regel gleich nach dem Eingriff gegeben.

- Körperliche Schonung ist für 3 Tage empfohlen.
- Der betroffene Arm ist konsequent hoch zu lagern bzw. hoch zu halten.
- Vermeiden Sie sportliche Aktivität, Vollbäder sowie Saunabesuche für mindestens 3 Wochen.